

Bovicalc® Dry

Bovicalc® Dry är ett oralt mineraltillskott, som ges till mjölkkor i samband med sinläggningen.

Sinperioden är en viktig viloperiod i en mjölkkos laktationscykel, den ger möjlighet till återhämtning mellan laktationer. Sinläggning kan vara en ganska svår och obekväm period, kor kan fortfarande producera avsevärda mängder mjölk och ackumulering av mjölk i bröstkörteln kan leda till problem och obehag.

Bovicalc® Dry sätter ned mjölkproduktionen och ger därmed ett minskat juvertryck och ökade liggtider (ökad välfärd).

Minskar trycket i juvret upp till tre dagar.



Bovicalc® Dry

Artikelnummer

406013 Bovicalc Dry 6X4/frp

405338 Ingivare Bovicalc

Rekommenderad användning

Bovicalc® Dry är kan ges till alla kor för att underlätta sinläggning.

Ge två bolusar av Bovicalc® Dry:

- efter sista mjölkningen före sinläggning
- eller 8 -12 timmar före den sista mjölkningen.

Bolusarna löses upp i våmmen inom ca 30 minuter och påverkar syra- basbalansen vilket framkallar en temporär metabolisk acidosis, denna minskar bildning av laktos i juvret. Kons aptit minskar också något.

Sammantaget leder detta till minskad mjölkproduktion och ger därmed effektivare och behagligare sinläggning.

Ge bara Bovicalc® Dry med avsedd ingivare

