



SUNDA MAGAR MED DIAKUR® PLUS



Boehringer
Ingelheim

BAKTERIER

VIRUS

PARASITER

BRISTANDE
RÅMJÖLKS-
RUTINER

FELAKTIGT
BLANDAT
MJÖLKPULVER

PLÖTSLIGA
FODERFÖR-
ÄNDRINGAR

FELAKTIG
MJÖLKTEM-
PERATUR



VARFÖR FÅR
KALVAR DIARRÉ?



LÄGRE MJÖLKPRODUKTION UNDER
FÖRSTA LAKTATIONEN



STÖRRE RISK FÖR ANDRA SJUKDOMAR
EX. LUNGINFLAMMATION



UTTORKNING



NEDSATT
VÄLBEFINNANDE




NEDSATT TILLVÄXT



STÖRD SYRA-BASBALANS



ÖKAD DÖDLIGHET



ÖKADE KOSTNADER OCH
MINSKAD ARBETSGLÄDJE

VILKA
NEGATIVA
KONSEKVENSER
KAN DIARRÉ
MEDFÖRA?

HUR FUNGERAR DIAKUR® PLUS?

Återställer elektrolytbalansen

- Natrium, klor och kalium ersätter förluster. Positiv jonbalans (SID +64 mmol/L i vatten, +102 mmol/L i mjölk) motverkar och korregerar förurning

Återställer vätske- och energibalansen

- Glukos, propionat, citrat och glycin ger energi och ökar samtidigt natriumupptaget, vilket leder till snabbare vätskeupptag

Återställer syra-basbalansen

- Unik 3-stegsbuffert (se nedan)


Motverkar bakterietillväxt

- Innehåller mannanoligosackarider och patenterade lecitinöverdragna pektinfibrer som binder till - och avlägsnar - sjukdomsframkallande bakterier

Dokumenterat god effekt

- Snabbare normal avföring och ökad tillväxt


Buffring i tre steg



SÅ ANVÄNDER DU DIAKUR® PLUS

Kalv	Mängd Diakur® Plus	Antal strukna mått	Mängd 35-40 grader varmt vatten, mjölk eller mjölkersättning	Hur länge
50 kg	100 g	2	2L	2-3 gånger/dag i upp til 7 dagar
Över 50 kg	150 g	3	3L	

Obs! Använd sond endast om Diakur® Plus är upplöst i vatten.



KOM IHÅG!
Uttorkade kalvar kan
behöva mer vätska
lite oftare



Diakur® Plus är ett
dietiskt fodertillskott
för stabilisering av
vätske-, syra-bas- och
elektrolytbalansen
i samband med
kalvdiarré



FÖREBYGGANDE



Råmjölk:

- God kvalitet
- 4 L till storvuxna raser och 2 L till jersey
- Så snart som möjligt efter födseln
- Så många dagar som möjligt
- Vid behov kan råmjölken förstärkas genom vaccination av kon



Hygien:


- Rena hinkar och skålar
- Rena desinficerade boxar/hyddor
- Förvara mjölken kallt

**Ge Diakur® Plus
vid misstanke
om diarré**



VAD BETYDER FORTSATT MJÖLKUTFODRING?

Viktförändring vid behandling av diarré med elektrolyter med/utan samtidig mjölkutfodring



Amerikansk studie med 3 olika behandlingar av kalvar med diarré (Garthwaite et al., 1994, J Dairy Sci 77, 835-843)

- **Grupp A: Ingen mjölk** dvs. det ges endast elektrolyter i 2 dygn. Därefter sker en gradvis återgång till mjölkutfodring under 5 dagar. Utfodring 2 gånger dagligen.
- **Grupp B: Lite mjölk** ges tillsammans med elektrolyter i 2 dygn. Därefter gradvis återgång till mjölkutfodring under 5 dagar. Utfodring 2 gånger dagligen.
- **Grupp C: Full mjölk** ges tillsammans med elektrolyter i 6 dagar. Utfodringen ändras från 2 till 3 gånger dagligen.

Studien visar att:

- tilldelning av elektrolyter och normal mjölmängd under hela behandlingsperioden ger den högsta tillväxten.
- samtidig utfodring med mjölk och elektrolyter varken förlänger eller förvärrar diarrén hos kalvar.



Spädkalvar
med diarré
behöver också
mjölk!

FRISKA MAGAR MED DIAKUR® PLUS

UPPDATERAD
VERSION



Förpackningar:

- 1 x 3 kg
- 1 x 10 kg

Dosmått medföljer

Har du frågor om Diakur® Plus är du välkommen att kontakta:



Sanna Soleskog
Technical Key Account Manager



+46 725 62 21 32



sanna.soleskog@boehringer-ingelheim.com



**Boehringer
Ingelheim**

www.vetportal.se