

# VIREX

REVIDERAD DEN: 23/09/24

**Koncentrerat pulver endast för professionellt bruk**  
**DJURUPPFÖDNING**  
**BAKTERIE- OCH VIRUSDÖDANDE DESINFICERINGSMEDEL FÖR MATERIAL,**  
**UTRUSTNING OCH YTOR**

BIOCIDPRODUKTER

verksamma ämnen per 100 g produkt: Troklosennatrium 2,4g +Trivätepentakaliumdi(peroxomonosulfat)di(sulfat) 45,1g  
HUVUDGRUPP 1: Desinfektionsmedel och allmänna biocidprodukter; Produkttyp 3: Hygienbiocidprodukter för veterinärverksamhet

## Fysikalisk-kemiska egenskaper

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Utseende                | Lättflytande pulver    |
| Färg                    | vit till rosa          |
| Lukt                    | Lätt klorerat          |
| Absolut pH-värde : (1%) | Ej tillämpligt         |
| pH vid 10g/l            | 2                      |
| Densitet                | Information saknas     |
| Frys punkt              | Ej disponibel          |
| Skenbar densitet        | 1,25 g/cm <sup>3</sup> |

## Egenskaper :

## Bruksanvisning:

VIREX är en bakterie- och virusdödande produkt som används för att desinficera ladugårdar, avelsutrustning och material, djurtransportfordon och för att desinficera stövlar på gården.

Använd VIREX varje gång djuren tas ut från byggnaden och dagligen på avelsutrymmen, utrustning, material, djurtransportfordon och stövlar.

Spreja på en applicering med lågt tryck:

Förbered en lösning av VIREX med den rekommenderade lösningsgraden:

Bakteriedödande vid 1 % (1 kg VIREX i 100 l vatten)

Virusdödande vid 2 % (2 kg VIREX i 100 l vatten)

Spreja den utspädda lösningen med lågt tryck på avelsutrymmen, utrustning och djurtransportfordon. För att minimera svinn, använd runt 300 ml/m<sup>2</sup> och låt verka i 30 minuter.

Temperatur: minst 10 °C

Applicera genom att doppa, stöveltvättsapplicering:

Förbered en lösning av VIREX med den rekommenderade lösningsgraden:

Bakteriedödande vid 1 % (1 kg VIREX i 100 l vatten)

Virusdödande vid 2 % (2 kg VIREX i 100 l vatten)

Applicera den utspädda lösningen genom att doppa utrustning eller material i ett bad.

Minsta kontakttid: 30 minuter.

Temperatur: minst 10 °C

# VIREX

REVIDERAD DEN: 23/09/24

## **Kontrollparametrar :**

Vänligen rådgör med din tekniker för frågor om kontrollparametrar.

## **Förpackning :**

|      |      |     |       |                  |
|------|------|-----|-------|------------------|
| påse | 0,1l |     | 0,1kg | (Hink 95x0,1 kg) |
| Hink | 5l   | Vit | 5kg   |                  |
| Hink | 10l  | Vit | 10kg  |                  |
| Hink | 22l  | Vit | 20kg  |                  |

Förvaras på ren, ventilerad plats, åtskilt från värmekällor och starkt ljus.

## **Kvalitet och säkerhet**

Se det säkerhetsdatablad som finns tillgängligt på INTERNET: <http://www.kersia-group.com>  
Använd produkten inom 24 månader från tillverkningsdatum.

## **Föreskrifter**

Den här produkten kan användas vid ekologiska lantbruk i enlighet med gällande regler.  
VIREX är en blandning i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier (Reach), utan avseende på tillverkningsplats.  
Ämnen som omfattas av Reach-förordningen och som ingår i VIREX har förhandsregistrerats eller registrerats av vårt företag eller av våra leverantörer uppåt i distributionskedjan.  
VIREX innehåller inget ämne som inger mycket stora betänkligheter i kandidatlistan över ämnen för godkännande som offentliggörs och uppdateras regelbundet av ECHA.

# VIREX

REVIDERAD DEN: 23/09/24

## Effektivitet

| Aktivitet        | Standard                             | Testade organismer                                                                  | Interfererande substans                    | Kontaktid. | Temperatur | Koncentration:                                                      |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  | General Orders                       |                                                                                     |                                            |            |            | Vid en spädningsgrad av 1 g desinficeringsmedel plus 100 ml vatten  |
| Bakteriella      | EN 1656                              | Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus | 3 g/l bovint albumin                       | 5min       | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  | EN 14349                             | Enterococcus hirae, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa                        | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Staphylococcus aureus                                                               | 3 g/l bovint albumin                       | 30min      | 10°C       | 1%                                                                  |
| Jästcell         | EN 16438                             | Candida albicans                                                                    | 3 g/l bovint albumin                       | 30min      | 10°C       | 3%                                                                  |
|                  | EN 1657                              | Candida albicans                                                                    | 3 g/l bovint albumin                       | 5min       | 10°C       | 1%                                                                  |
| Virusbakteriella | Avian Influenza Order                |                                                                                     |                                            |            |            | Vid en spädningsgrad av 1 g desinficeringsmedel plus 100 ml vatten  |
|                  | Diseases of Poultry Order            |                                                                                     |                                            |            |            | Vid en spädningsgrad av 1 g desinficeringsmedel plus 100 ml vatten  |
|                  | EN 14675                             | Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)                                                    | 3 g/l bovint albumin                       | 30min      | 10°C       | 1%                                                                  |
|                  |                                      |                                                                                     |                                            |            | 4°C        | 1,5%                                                                |
|                  |                                      | Aujesky's disease virus (strain NIA1)                                               | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Avian Influenza (A/Turkey/Eng/N28/73)(H5N1)                                         | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 1%                                                                  |
|                  |                                      | Avian Influenza (H5N2)                                                              | 3 g/l bovint albumin                       | 30min      | 4°C        | 1,5%                                                                |
|                  |                                      | Avian Reovirus (Uchida strain)                                                      | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Bovine Enterovirus type 1 (strain VG/5/27)                                          | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 2%                                                                  |
|                  |                                      | Bovine parainfluenza type 3 virus (strain 125)                                      | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Bovine viral diarrhea virus (strain NADL)                                           | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Chicken Anaemia Virus (strain Cux)                                                  | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Egg Drop Syndrome Virus (strain 127)                                                | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 1%                                                                  |
|                  |                                      | Feline Calicivirus (FeCV) strain F9                                                 | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Infectious Bovine Rhinotracheitis virus (JCF strain)                                | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Infectious Bursal Disease Virus (strain G13)                                        | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Infectious Pancreatic Necrosis virus (strain A2, Sp)                                | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      |                                                                                     |                                            |            | 4°C        | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Porcine circovirus type 2 (strain 1010)                                             | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 1%                                                                  |
|                  |                                      | Porcine Parvovirus (strain 59E)                                                     | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      | Porcine respiratory & Reproductive Syndrome virus (Lelystad strain)                 | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 0,2%                                                                |
|                  |                                      | Teschen virus (strain F65)                                                          | 10 g/l bovint albumin + 10 g/l jästextrakt | 30min      | 10°C       | 2%                                                                  |
|                  |                                      | African swine fever virus (ASF)                                                     | 3 g/l bovint albumin                       | 30min      | 10°C       | 1%                                                                  |
|                  |                                      |                                                                                     |                                            |            | 20°C       | 0,5%                                                                |
|                  |                                      |                                                                                     |                                            | 5min       | 4°C        | 1%                                                                  |
|                  |                                      |                                                                                     |                                            | 60min      | 20°C       | 0,25%                                                               |
|                  | Foot and Mouth Disease               |                                                                                     |                                            |            |            | Vid en spädningsgrad av 1 g desinficeringsmedel plus 1300 ml vatten |
|                  | Influenza of Avian Origin in Mammals |                                                                                     |                                            |            |            | Vid en spädningsgrad av 1 g desinficeringsmedel plus 100 ml vatten  |
|                  | Swine Vesicular Disease              |                                                                                     |                                            |            |            | Vid en spädningsgrad av 1 g desinficeringsmedel plus 100 ml vatten  |